



傷口引流管之護理指導

編號：QP-S-02-N0105

◎目的：使體內積聚液體排出體外，促進傷口癒合及預防感染。

◎注意事項：

- 1.防止移位或滑脫：用安全別針或夾子固定，預留適當的長度，給予翻身或活動的空間。
- 2.預防感染：
 - (1)保持引流袋低於引流位置之下，防止逆流，下床活動時用安全別針將引流袋固定於衣角，不可高於傷口位置。
 - (2)引流液達引流袋 1/2 滿時，請告知護理人員予以傾倒。
 - (3)引流管避免扭曲、壓迫，多翻身下床可促進引流，以利傷口癒合。
 - (4)傷口引流管紗布滲濕時，請告知醫護人員給予換藥。
 - (5)引流管勿拖垂於地板，以防感染。
 - (6)觀察引流液的顏色、量、性質（一般為深色變淺色，量多變量少），若有改變，應通知醫護人員處理。
- 3.若有以下情形請告知護理人員：
 - (1)發燒、劇烈嘔吐、腹痛。
 - (2)引流管滑脫。
 - (3)引流液突然減少、無引流量或有大量鮮紅色血液。
 - (4)引流管傷口紅、腫、痛或有膿樣分泌物。
- 4.拔除時間：若引流量逐漸減少，醫師會依傷口癒合情形，拔除引流管。

員生醫院關心您！